



## Criança

Para vacinar, basta levar a criança a um posto ou Unidade Básica de Saúde (UBS) com o cartão da criança. O ideal é que toda dose seja administrada na idade recomendada. Entretanto, se perdeu o prazo para alguma dose é importante voltar à unidade de saúde para atualizar as vacinas.

A maioria das vacinas disponíveis no Calendário Nacional de Vacinação é destinada a crianças. São 12 vacinas, aplicadas antes dos 10 anos de idade em 25 doses.

### Ao nascer:

- BCG (Bacilo Calmette-Guerin) – (previne as formas graves de tuberculose, principalmente miliar e meníngea) - dose única.
- Hepatite B – dose única.-

### 2 meses:

- Pentavalente (previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por HiB) – 1<sup>a</sup> dose.
- Vacina Inativada Poliomielite (VIP) (previne poliomielite ou paralisia infantil) – 1<sup>a</sup> dose.
- Pneumocócica 10 Valente (previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo) – 1<sup>a</sup> dose.
- Rotavírus (previne diarreia por rotavírus) – 1<sup>a</sup> dose.

### 3 meses:

- Meningocócica C (previne a doença meningocócica C) – 1<sup>a</sup> dose.

### 4 meses:

- **Pentavalente** (previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por Haemóphilus influenzae tipo B) – 2<sup>a</sup> dose.
- **Vacina Inativada Poliomielite (VIP)** - (previne a poliomielite ou paralisia infantil) – 2<sup>a</sup> dose.
- **Pneumocócica 10 Valente** (previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo) – 2<sup>a</sup> dose.
- **Rotavírus** (previne diarreia por rotavírus) – 2<sup>a</sup> dose.

### 5 meses:

- **Meningocócica C** (previne doença meningocócica C) – 2<sup>a</sup> dose.

### 6 meses:

- **Pentavalente** (previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por HiB) – 3<sup>a</sup> dose.



- **Vacina Inativada Poliomielite (VIP)** - (previne poliomielite ou paralisia infantil) – 3<sup>a</sup> dose.

**9 meses:**

- **Febre Amarela** – dose única (previne a febre amarela).

**12 meses:**

- Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) – 1<sup>a</sup> dose.
- Pneumocócica 10 Valente (previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo) – Reforço.
- Meningocócica C (previne doença meningocócica C) – Reforço.

**15 meses:**

- DTP (Difteria, tétano e coqueluche) – 1º reforço.
- Vacina Oral Poliomielite (VOP) - (previne poliomielite ou paralisia infantil) – 1º reforço.
- Hepatite A – dose única.
- Tetra viral ou tríplice viral + varicela – (previne sarampo, rubéola, caxumba e varicela/catapora) - Uma dose.

**4 anos:**

- DTP (Difteria, tétano e coqueluche) – 2º reforço.
- Vacina Oral Poliomielite (VOP) – (previne poliomielite ou paralisia infantil) - 2º reforço.
- Varicela atenuada (previne varicela/catapora).

## Adolescente

A caderneta de vacinação deve ser frequentemente atualizada. Algumas vacinas só são administradas na adolescência. Outras precisam de reforço nessa faixa-etária. Além disso, doses atrasadas também podem ser colocadas em dia. Veja as vacinas recomendadas a adolescentes:

**9 a 14 anos (meninas):**

- HPV (previne o papiloma, vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais) - 2 doses com seis meses de intervalo.

**11 a 14 anos (meninos):**

- HPV (previne o papiloma, vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais) - 2 doses com seis meses de intervalo.

**11 a 14 anos:**

- Meningocócica C (doença invasiva causada por *Neisseria meningitidis* do sorogrupo C) – Dose única ou reforço.

**10 a 19 anos:**

- Hepatite B - 3 doses, de acordo com a situação vacinal.
- Febre Amarela – 1 dose se nunca tiver sido vacinado.
- Dupla Adulto (previne difteria e tétano) – Reforço a cada 10 anos.
- Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) - 2 doses, a depender da situação vacinal anterior.
- Pneumocócica 23 Valente(previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo) – 1 dose a depender da situação vacinal - A vacina Pneumocócica 23V está indicada para grupos-alvo específicos.
- Dupla Adulto (previne difteria e tétano) - Reforço a cada 10 anos.

**Adulto**

É muito importante que os adultos mantenham suas vacinas em dia. Além de se proteger, a vacina também evita a transmissão para outras pessoas que não podem ser vacinadas. Imunizados, familiares podem oferecer proteção indireta a bebês que ainda não estão na idade indicada para receber algumas vacinas, além de outras pessoas que não estão protegidas. Veja lista de vacinas disponibilizadas a adultos de 20 a 59 anos.

**20 a 59 anos:**

- Hepatite B - 3 doses, de acordo com a situação vacinal
- Febre Amarela – dose única, verificar situação vacinal
- Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) – se nunca vacinado: 2 doses (20 a 29 anos) e 1 dose (30 a 49 anos).
- Dupla adulto (DT) (previne difteria e tétano) – Reforço a cada 10 anos.
- Pneumocócica 23 Valente (previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo) – 1 dose é indicada para grupos-alvo específicos a depender da situação vacinal.

**Idoso**

São três as vacinas disponíveis para pessoas acima de 60 anos, além da campanha de vacinação contra gripe.

**60 anos ou mais:**

- Hepatite B - 3 doses, de acordo com a situação vacinal.
- Febre Amarela – dose única, verificar situação vacinal.
- Dupla Adulto (previne difteria e tétano) – Reforço a cada 10 anos.
- Pneumocócica 23 Valente (previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo) – reforço a depender da situação vacinal - A vacina está indicada para grupos-alvo específicos, como pessoas com 60 anos e mais não vacinados que vivem acamados e/ou em instituições fechadas.

**Gestante**



A vacina para mulheres grávidas é essencial para prevenir doenças para si e para o bebê. Elas não podem tomar as mesmas vacinas que qualquer adulto e, portanto, têm um esquema vacinal diferenciado. Veja as vacinas indicadas para gestantes.

- Hepatite B - 3 doses, de acordo com a situação vacinal.
- Dupla Adulto (DT) (previne difteria e tétano) – 3 doses, de acordo com a situação vacinal.
- dTpa (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) - previne difteria, tétano e coqueluche – Uma dose a cada gestação a partir da 20<sup>a</sup> semana de gestação ou no puerpério (até 45 dias após o parto).

## Calendário Nacional de Vacinação dos Povos Indígenas

### Criança

#### Ao nascer:

- BCG – dose única - (previne as formas graves de tuberculose, principalmente miliar e meníngea).
- Hepatite B – dose única.

#### 2 meses:

- Pentavalente (Previne Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e Meningite e infecções por HiB) – 1<sup>a</sup> dose.
- Vacina Inativada Poliomielite(VIP) (poliomielite ou paralisia infantil) – 1<sup>a</sup> dose.
- Pneumocócica 10 Valente (previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo) – 1<sup>a</sup> dose.
- Rotavírus (previne diarreia por rotavírus) – 1<sup>a</sup> dose.

#### 3 meses:

- Meningocócica C (previne a doença meningocócica C) – 1<sup>a</sup> dose.

#### 4 meses:

- Pentavalente (previne difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e Meningite e infecções por Haemóphilus influenzae tipo B) – 2<sup>a</sup> dose.
- Vacina Inativada Poliomielite(VIP) (Poliomielite ou paralisia infantil) – 2<sup>a</sup> dose.
- Pneumocócica 10 Valente (previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo) – 2<sup>a</sup> dose.
- Rotavírus (previne diarreia por rotavírus) – 2<sup>a</sup> dose.

#### 5 meses:

- Meningocócica C (previne doença meningocócica C) – 2<sup>a</sup> dose.

#### 6 meses:



- Pentavalente (previne Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e meningite e infecções por HiB) – 3<sup>a</sup> dose.
- Vacina Inativada Poliomielite(VIP) (Poliomielite ou paralisia infantil) – 3<sup>a</sup> dose.

**9 meses:**

- Febre Amarela – dose única (previne a febre amarela).

**12 meses:**

- Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) – 1<sup>a</sup> dose.
- Pneumocócica 10 valente(previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo) – Reforço.
- Meningocócica C (previne doença meningocócica C) – reforço.

**15 meses:**

- DTP (Difteria, tétano e coqueluche) – 1º reforço.
- Vacina Oral Poliomielite (VOP) - (poliomielite ou paralisia infantil) – 1º reforço.
- Hepatite A – dose única.
- Tetra viral ou tríplice viral + varicela – (previne sarampo, rubéola, caxumba e varicela/catapora) - Uma dose.

**4 anos:**

- DTP (previne difteria, tétano e coqueluche) – 2º reforço.
- Vacina Oral Poliomielite (VOP) – (poliomielite ou paralisia infantil) - 2º reforço.
- Varicela atenuada(varicela/catapora) – uma dose.

**5 anos:**

- Pneumocócica 23 v – uma dose – A vacina está indicada para grupos-alvo específicos, como a população indígena a partir dos 5 (cinco) anos de idade.

**9 anos:**

- HPV (Papiloma vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais) – 2 doses (meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos).

## **Adolescente**

**10 a 19 anos:**

- Meningocócica C (doença invasiva causada por *Neisseria meningitidis* do sorogrupo C) – 1 reforço ou dose única de 12 a 13 anos - verificar a situação vacinal.
- Febre Amarela – dose única (verificar a situação vacinal).
- Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) - 2 doses, a depender da situação vacinal anterior.
- HPV (Papiloma vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais) – 2 doses (meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos).
- Pneumocócica 23 valente (previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo) – 1 dose a depender da situação vacinal.



- Dupla Adulto (previne difteria e tétano) – Reforço a cada 10 anos.
- Hepatite B – (previne hepatite B) - 3 doses, de acordo com a situação vacinal.

## **Adulto**

### **20 a 59 anos:**

- Hepatite B (previne hepatite B) - 3 doses, de acordo com a situação vacinal.
- Febre Amarela (previne febre amarela) – dose única, verificar situação vacinal.
- Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) – se nunca vacinado: 2 doses (20 a 29 anos) e 1 dose (30 a 49 anos).
- Pneumocócica 23 valente (previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo) – 1 dose a depender da situação vacinal.
- Dupla adulto (DT) (previne difteria e tétano) – Reforço a cada 10 anos.

## **Idoso**

### **60 ou mais:**

- Hepatite B (previne hepatite B) - 3 doses, de acordo com a situação vacinal.
- Febre Amarela (previne febre amarela) – dose única, verificar situação vacinal.
- Pneumocócica 23 valente (previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo) – reforço a depender da situação vacinal - A vacina está indicada para grupos-alvo específicos, como pessoas com 60 anos e mais não vacinados que vivem acamados e/ou em instituições fechadas.
- Dupla Adulto (previne difteria e tétano) – Reforço a cada 10 anos.

## **Gestante**

- Hepatite B (previne hepatite B) - 3 doses, de acordo com a situação vacinal.
- Dupla Adulto (DT) (previne difteria e tétano) – 3 doses, de acordo com a situação vacinal.
- dTpa (previne difteria, tétano e coqueluche) – Uma dose a cada gestação a partir da 20<sup>a</sup> semana.